



โรงพยาบาลสุโขทัย



+ บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 +

ฉีดทุกกลุ่มวัย

เฉพาะวันอังคาร

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น.

เริ่มอังคารที่ 26 เมษายน 2665

 งานปฐมนิคม โรงพยาบาลสุโขทัย 

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี



- 1 หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ระบายอากาศได้ไม่ดี
- 2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อต้องออกนอกบ้าน
- 3 เมื่อมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยสนทนากัน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 4 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- 5 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และฉีดเข็มกระตุ้นให้เด็ก ที่เคยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 - 6 เดือน
- 6 หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับ ผู้ป่วยติดเชื้อ ให้รีบบอกผู้ปกครอง เพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ATK



แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 5 - น้อยกว่า 12 ปี



- 1 หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ระบายอากาศได้ไม่ดี
- 2 ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเสร็จจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- 3 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
- 4 หากมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าและพื้นผิวต่างๆ
- 5 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้เด็ก (โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต
- 6 หากเด็กมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับผู้ป่วย ให้รีบบอกผู้ปกครองตรวจหาเชื้อด้วย ATK
- 7 กรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายตัวสงสัยติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ควรรีบแยกตัวออกจากเด็กและตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทั้งนี้ หากพบเป็นบวกให้โทรติดต่อสายด่วน 1330

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
1422

ต่อไป